



FDGDON du CANTAL

Section d'OVS

FREDON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Méthode pour évaluer la présence de campagnol terrestre (Après passage de la herse 2-3 jours avant la notation)

Notations d'infestation :

- à la parcelle,
- par l'agriculteur,
- en suivant la plus grande diagonale



Protocole de notations :


1/ Je repère la plus grande diagonale de ma parcelle.

2/ Pour le campagnol terrestre :

Je **note** la présence de **rejets frais de campagnols terrestres** dans chaque intervalle de **5 x 5 m** le long de cette diagonale.

Présence fraîche sur l'intervalle: 1

Absence : 0



Notation campagnol terrestre



FDGDON du CANTAL

Section d'OVS

FREDON AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Méthode pour évaluer la présence de campagnol terrestre (Après passage de la herse 2-3 jours avant la notation)

RELEVÉ D'OBSERVATIONS PARCELLAIRES

Date d'observations :

Désignation de la parcelle et/ou îlot PAC :

| Nbre intervalles observés | Présence (1) Absence (0) |
|--|-----------------------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| Somme des 1 | (a) |
| TOTAL d'INTERVALLES OBSERVES | (b) |
| Densité de campagnols à la parcelle " = a / b * 100 " | |

Si densité > 30 % = traitement interdit

Si < 30 % : je peux traiter
Si > 30 % : je ne peux pas traiter

